

Till dig som har hjärtsvikt

Var uppmärksam på följande:

- Viktökning över 2 kg på 3 dagar
- Ökad andfåddhet
- Svullnad över mage/buk
- Svullnad i benen



Skulle du uppleva något av dessa besvär, öka det vätskedrivande läkemedel som du redan har fått. Tabletterna kan vara antingen **Furix**, **Lasix**, **Furosemid** eller **Torem**. Öka dosen i 2-3 dagar. Om ingen förbättring sker kontakta din vårdcentral eller hjärtsviktsmottagning.

Om du drabbas av magsjuka med kräkning och/eller diarré

För att undvika uttorkning och påverkan på njurarna, gör ett tillfälligt uppehåll med följande mediciner under tiden du är sjuk:

- ACE-hämmare, till exempel **Enalapril** eller **Ramipril**
- Angiotensinreceptorhämmare, till exempel **Candesartan** eller **Losartan**
- Mineralreceptorantagonister, till exempel **Eplerenon**, **Inspira** eller **Spironolakton**
- **Entresto**
- Vätskedrivande medicin, till exempel **Furix**, **Lasix**, **Furosemid** eller **Torem**
- **Forxiga**, **Jardiance**, **Metformin**

Informationen ovan riktar sig till dig som har fått diagnosen hjärtsvikt ställd av läkare. Mer information om dina läkemedel finns på 1177.